



最新消息

一、2022 台灣基層透析協會區域研討會(0426 台北)

日期：2022 年 04 月 26 日 (星期二)

時間：18：00 - 21：00

地點：台北喜來登大飯店 2F 瑞穗廳
(台北市中正區忠孝東路一段 12 號)

講師：1. 新光醫院腎臟科 呂至剛 教授
2. 高雄長庚醫院腎臟科 楊智超 副教授

報名網址：<https://forms.gle/KiGgTotiFAYhu3fQ6>



<手機可掃右方 QR CODE，即可連結至報名表單，謝謝！>

議程：

Time	Topic	Speaker
18:00-18:30	Registration	All
18:30-18:40	Opening/用餐	楊孟儒 理事長
18:40-19:20	透析患者高磷問題的藥物治療	呂至剛 教授
19:20-20:00	透析患者腎毒素與蛋白質能量耗損	楊智超 副教授
20:00-20:40	總額爭取策略研商	林元灝 秘書長
20:40-20:50	Panel Discussion	全體與會人員
20:50-21:00	Closing	楊孟儒 理事長

二、設有血液透析室之醫療機構因應 COVID-19 感染管制措施指引

設有血液透析室之醫療機構 因應 COVID-19 感染管制措施指引

衛生福利部疾病管制署

109 年 08 月 31 日初訂 1 版

109 年 11 月 18 日修訂 2 版

110 年 06 月 05 日修訂 3 版

111 年 03 月 30 日修訂 4 版

壹、前言

自 2019 年底發生新型冠狀病毒造成的肺炎疫情，世界衛生組織將此疾病命名為 Coronavirus disease 2019 (COVID-19)，而病原體命名為 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)。國際間疫情持續擴大，受影響的國家與地區已陸續傳出疫情，或發生醫療機構群聚病例。血液透析的病人因為侵入性醫療處置、免疫力下降及治療照護過程中醫療照護人員頻繁的接觸等多重因素，為 COVID-19 的高危險族群，且一旦感染易發展為重症。為協助設有血液透析室之醫療機構因應 COVID-19 疫情，降低機構內傳播的風險，爰參考美國疾病管制與預防中心 (Centers for Disease Control and Prevention) 及英國國家健康與照顧卓越研究院 (National Institute for Health and Care Excellence, NICE) 等國內外相關指引與建議，訂定本指引，以強化病人分流就醫、病人安置、個人防護裝備、手部衛生、清潔與消毒等為優先事項，提供前述機構依其特性與實務狀況參考內化，加以應用落實。

貳、感染管制建議

一、強化病人分流就醫

- (一) 於機構出入口、掛號櫃檯、門診區與網頁等有明確公告、廣播或志工主動關懷等方式，提醒進入機構的人 (如病人、訪客、工作人員、外包人員等) 請佩戴口罩，並應有協助未佩

戴口罩的就醫民眾與訪客佩戴口罩的機制，如主動提供口罩或口罩販售之服務。

- (二) 加強病人分流機制，於機構出入口、門診等區域設有及早發現發燒或呼吸道症狀之就醫民眾與訪客的機制，如紅外線體溫監測、發燒篩檢站、或請工作人員詢問病人是否有發燒或呼吸道症狀等方式。
- (三) 機構應在病人進入治療區域之前，落實詢問旅遊史 (Travel history, 如最近 14 日旅遊史)、職業別 (Occupation, 如醫院工作者、交通運輸業、旅遊業)、接觸史 (Contact history, 如是否出入人潮眾多場所或接觸至國外旅遊且有發燒/呼吸道症狀之親友/家屬) 及是否群聚 (Cluster, 如家人/朋友/同事也有發燒或呼吸道症狀, 同住家人正在居家檢疫/居家隔離/自主健康管理), 並確認其是否具 COVID-19 感染風險*。

*請參考【疾病管制署首頁(<https://www.cdc.gov.tw>)>傳染病與防疫專題>傳染病介紹>第五類法定傳染病>嚴重特殊傳染性肺炎之「宣導素材>單張>具感染風險民眾追蹤管理機制」】

1. 衛教病人，如有發燒、呼吸道症狀、味覺嗅覺喪失、不明腹瀉等 COVID-19 相關症狀、曾進行 SARS-CoV-2 採檢或具 COVID-19 感染風險，應事先告知機構，以利機構事先準備，或將其分流至更合適的機構 (如：醫院)。並提醒病人可以線上查詢就診進度，或以電話聯繫預約就診時間等方式，鼓勵依預約時間準時前往機構，勿提早到達機構，以避免於機構等候時間。
2. 應在病人或訪客進入機構時 (如：在掛號櫃台報到時)，有相關監測機制可確認其體溫、或仍在居家隔離/居家檢疫/自主健康管理中等情形；並提醒病人或訪客，若其有發燒、呼吸道症狀、味覺嗅覺喪失、不明腹瀉等 COVID-

19 相關症狀或具 COVID-19 感染風險時應立即告知工作人員。

3. 須常規血液透析的居家隔離/居家檢疫/自主健康管理者，仍應如期接受透析治療，以免延誤自身病情，惟就醫前需聯絡地方衛生局，依指定之方式前往指定之醫療機構就醫。

4. 如有發燒、呼吸道症狀、味覺嗅覺喪失、不明腹瀉等症狀病人，經醫師評估為疑似 COVID-19 或其他具群聚傳染性之疾病，應立即分流，勿先行接觸病人。如需安排轉診事宜，請依循「醫療院所因應 COVID-19 分流就醫及轉診建議」處理；等待轉診期間，應請病人將口罩戴好，安置於獨立空間（使用牆壁、玻璃隔板，或可移動、清洗之屏風，或圍簾等實體屏障區隔出的空間），避免與他人接觸。（若為社區流行，請參閱參、因應社區流行管控措施）

（四）應訂定機構內全體工作人員（含流動工作人員）健康監測計畫，並有異常追蹤處理機制。落實工作人員每日體溫量測及健康狀況監測（包括體溫及相關症狀），確實登錄，並針對監測異常結果加以處理，並留有紀錄。

（五）機構應實施非懲罰性、具彈性且符合公共衛生政策的請假政策，提醒醫療照護工作人員發燒生病不上班。醫療照護工作人員若出現發燒、呼吸道症狀、嗅覺味覺喪失、不明腹瀉等疑似症狀，應立即依機構內流程主動通報單位主管或負責人員，並確實遵循如呼吸道衛生與咳嗽禮節等相關感染管制措施，及接受所需之醫療協助，安排休假或限制從事照護工作。具 COVID-19 感染風險的醫療照護工作人員請參考「因應 COVID-19 疫情醫療照護工作人員自主健康管理期間返回工作建議」。

（六）由於無症狀感染者仍有 COVID-19 的傳播風險，強調於機

構內均需佩戴口罩、保持適當距離、落實手部衛生及環境清潔消毒等預防措施的重要性。機構應提供 COVID-19 相關宣導，包括佩戴口罩、維持適當的社交距離、落實手部衛生、遵循呼吸道衛生及咳嗽禮節、陪探病管理配套措施及減少在單位內飲食。

1. 宣導內容應包括：正確佩戴口罩（如進入機構應全程佩戴；口罩應完全覆蓋口、鼻）、落實呼吸道衛生及咳嗽禮節（如當打噴嚏或咳嗽時，使用衛生紙掩蓋口鼻，若有痰液或鼻涕，應使用紙巾包好後，棄於垃圾桶內；處理鼻涕或飛沫後，需清潔雙手）、執行手部衛生、減少在單位內飲食，以降低病毒傳播的風險。
2. 於機構入口明顯處宣導（如：張貼海報），提醒有發燒、呼吸道症狀、味覺嗅覺喪失、不明腹瀉等 COVID-19 相關症狀及具 COVID-19 感染風險的病人要主動告知工作人員，以採取適當的防護措施。
3. 所有陪（探）病人員紀錄應造冊管理，並保留至少 1 個月。個資收集應依循「COVID-19 防疫新生活運動實聯制措施指引」辦理。

(七) 機構應於血液透析床、護理站、入口及候診區附近，提供手部衛生用品（如：酒精性乾洗手液等）、非接觸式有蓋垃圾桶等相關防疫用品，以確保病人及醫療照護人員遵守手部衛生、呼吸道衛生及咳嗽禮節。另建議於掛號/報到區設置物理性屏障（如：玻璃或塑膠隔板），以減少檢傷人員與潛在傳染性病人密切接觸的風險。

(八) 接種 COVID-19 疫苗是預防感染、避免重症與死亡最有效的方式。由於透析病人免疫力低、老年族群多、出入透析機構頻繁，為感染高危險族群。為防範機構傳播風險，應訂有全院工作人員 COVID-19 疫苗接種計畫，由領導階層帶領，

落實執行。符合公費 COVID-19 疫苗、流感疫苗、及肺炎鏈球菌疫苗接種對象，經醫師評估未有具接種禁忌症而不適合接種者，應宣導並協助其接受疫苗注射。

二、病人安置

- (一) 機構應於候診區規劃適當空間，避免候診區出現擁擠情形，建議規劃減少病人近距離接觸及候診時間之配套措施，如線上查詢就診進度或以電話聯繫就診時間等方式。
- (二) 如有發燒、呼吸道症狀、味覺嗅覺喪失、不明腹瀉等症狀，經醫師評估為疑似 COVID-19 或其他群聚具傳染性之疾病，或居家隔離/檢疫/或未具有自主健康管理期間呼吸道檢體 SARS-CoV-2 核酸檢驗陰性結果之自主健康管理者的病人應立即分流，於適當防護之下，經由規劃好之動線，儘快帶至專屬候診區或適當的治療區域，與其他病人區隔，並維持適當的社交距離。儘量減少其停留在候診區的時間。且確定所有第一線工作人員均瞭解此流程。
- (三) 照護疑似或確診 COVID-19 病人，醫療照護人員應遵循「醫療機構因應 COVID-19 感染管制指引」相關建議，依分流分艙、分區照護（照護人員分群分組，分開工作及休息）、固定團隊（固定人員執行直接接觸及醫療照護，避免輪班）、固定透析設備（加強相關儀器設備清潔消毒）、固定空間為照護原則。
- (四) 照護疑似或確診 COVID-19、有相關症狀或居家隔離/檢疫/或未具有自主健康管理期間呼吸道檢體 SARS-CoV-2 核酸檢驗陰性結果之自主健康管理者病人，原則上應安排於單獨的病室中接受透析治療，治療時應維持房門關閉。如果沒有單獨的病室，則應規劃空間動線或以出入時間為區隔，將這些病人安排遠離主要動線的空曠或人流較少的角落區域或時段。建議在相同區域和/或同一班由同一組照護人員著

合適之個人防護裝備集中進行照護(如:當天的最後一班),且病人間保持至少 2 公尺之距離。如果呼吸道症狀的病因已知,則病因不同的病人不應集中照護(如:確診為流感和 COVID-19 的病人不應集中照護),以免交叉感染。

- (五) 非 B 型肝炎表面抗原陽性之疑似 COVID-19 病人,非緊急情形,原則上不能使用 B 型肝炎專屬透析設備及空間。
- (六) 確保病人或家屬(訪客)了解並能配合機構因應 COVID-19 疫情所採取之相關防護措施。

三、個人防護裝備

- (一) 於公共區域的第一線工作人員(如:入口服務人員、掛號、批價等),建議佩戴醫用/外科口罩。
- (二) 詢問相關主訴及 TOCC 等資料,以及執行一般性接觸病人之醫療照護行為,如生命徵象評估(量體溫、血壓)、診療等,建議佩戴醫用/外科口罩。
- (三) 執行接觸病人血液、體液、排泄物等風險之醫療照護行為,應佩戴醫用/外科口罩、戴手套,並視血、體液可能噴濺之程度與情形穿著防水隔離衣,佩戴護目裝備(全面罩)。
- (四) 於 COVID-19 疫情流行期間,如非醫療必要,儘量避免執行可能會引發咳嗽或呼吸道飛沫微粒(aerosol)的醫療處置。如有必要執行可能產生大量飛沫微粒的醫療處置時,建議穿戴高效過濾口罩(N95 或相當等級(含)以上口罩)、戴手套、防水隔離衣、護目裝備(全面罩)與髮帽。且應在獨立空間/單人病室內執行,僅容許執行處置所必須的人員留在病室中,減少受暴露的人數。
- (五) 機構若為照護疑似或確診 COVID-19 的病人,應遵循「醫療機構因應 COVID-19 感染管制指引」之醫療照護工作人員個人防護裝備建議,穿戴高效過濾口罩(N95 或相當等級(含)以上口罩)、戴手套、隔離衣、護目裝備及髮帽。

- (六) 照護居家隔離/居家檢疫/自主健康管理的病人，醫療照護人員應遵循「居家隔離、檢疫或自主健康管理者接受醫療照護時之感染管制措施」之個人防護裝備建議。
- (七) 在脫除個人防護裝備時需依照疾病管制署提供之正確流程執行。個人防護裝備須於離開所照護之病人區域前脫除，並將其置入廢棄物或被服專用的容器中。拋棄式隔離衣應於使用後丟棄，非拋棄式隔離衣則應於每次使用後依感染性污衣運送清洗。在脫除後，請務必立即執行手部衛生。

四、手部衛生

- (一) 依循手部衛生 5 時機執行手部衛生（即：接觸病人前、執行清潔/無菌操作技術前、暴觸病人風險後、接觸病人後、接觸病人環境後）。
- (二) 於護理站、病床旁設置酒精性乾洗手設備，或提供醫療照護工作人員攜帶型酒精性乾洗手液，以提升工作人員手部衛生遵從性。
- (三) 使用肥皂和清水或酒精性乾洗手液進行手部衛生。如果雙手沒有明顯髒汙，可使用酒精性乾洗手液代替清水與肥皂，執行手部衛生。
- (四) 考量透析作業過程具有暴觸血液的風險，建議工作人員於過程中應配戴手套。
- (五) 工作人員勿戴戒指、腕錶、以及任何腕部裝飾品。

五、清潔與消毒

- (一) 公共區域或看診區每日應進行至少 1 次環境清潔工作，尤其對於手部常接觸的表面如門把、工作桌面、電腦鍵盤、滑鼠等，應加強清潔工作，增加清潔頻率。若環境有明顯遭病人口鼻分泌物汙染時，則須立即進行清潔及消毒。
- (二) 病人透析結束後，治療區環境（包括血液透析床、血液透析設備、桌椅等設備表面）必須完成清潔消毒，才能提供給下

一位病人使用；消毒過程中應使用足夠量的消毒劑擦拭環境表面，原則上擦拭後表面應達可見潮濕（visibly wet）並保留足夠時間讓消毒劑自然乾燥。

- (三) 照護疑似或確診 COVID-19、有發燒、呼吸道症狀、味覺嗅覺喪失、不明腹瀉等 COVID-19 相關症狀或具 COVID-19 感染風險之透析患者，應使用適當消毒劑(如 1:50(1000ppm) 漂白水稀釋液)清潔消毒其至少 2 公尺範圍內的環境表面、用品或設備（如：血液透析設備），於狀況許可下儘量使用拋棄式物品，並針對頻繁接觸的環境表面適度增加清潔消毒之頻率。
- (四) 機構若為照護疑似或確診 COVID-19 的病人：
1. 應遵循「醫療機構因應 COVID-19 感染管制指引」之環境清潔人員於執行病例環境清消個人防護裝備，建議穿戴高效過濾口罩（N95 或相當等級（含）以上口罩）、戴手套、防水隔離衣、護目裝備(全面罩)及髮帽，視需要穿可清洗之防水鞋具，並應正確使用相關防護裝備。
 2. 消毒劑應依照廠商建議使用，包括稀釋方法、接觸時間與處理方式；如使用當天泡製的 1：50（1000ppm）漂白水稀釋液，進行桌椅等環境表面及地面擦拭。
 3. 當有病人口鼻分泌物、血液、體液或排泄物等明顯髒污時，若為小範圍(<10ml)污染，應先以低濃度(1000ppm)的漂白水覆蓋在其表面 10 分鐘進行去污作用，若污染範圍大於 10ml 以上，則需以高濃度（5000ppm）的漂白水覆蓋在其表面 10 分鐘進行去污，再以清潔劑或肥皂和清水移除髒污與有機物質，並接續使用濕抹布及合適的消毒劑執行有效的環境清消。
- (五) 使用的消毒劑應同時對血液傳染病原體有效(如：B 型肝炎病毒、HIV)。

六、建議可參考附錄「設有血液透析室之醫療機構因應 COVID-19 整備現況查檢表」進行整備現況自我查檢。

參、因應社區流行管控措施

一、高社區傳播風險地區機構門診病人，可依以下原則進行 COVID-19 抗原快篩：

- (一) 無 COVID-19 相關症狀透析病人，經醫師 TOCC 評估或有疑慮時，得定期於每週進行 1 次公費抗原快篩。
- (二) 透析病人之非固定陪病者避免進入治療區；固定陪病者（原則以每週為單位認計）因病人狀況仍須進入治療區陪病，且依醫師評估或有疑慮時，得於每週進行 1 次自費抗原快篩（收費標準由機構報請地方政府衛生局依相關規定核定），建議於檢驗陰性後始得進入。

二、機構門診病人具 COVID-19 相關症狀，經醫師 TOCC 評估或有疑慮時，應依「COVID-19 傳染病通報及送檢驗新流程說明及注意事項」進行採檢核酸檢驗，並視需求進行抗原快篩。倘機構因故無法採檢時，應妥為安排轉診至應變醫院或地方衛生局指定之醫療院所進行採檢及透析，且應事先與醫院聯繫。

三、於疫情期間應避免不必要之陪病，倘透析病人有陪病需求時，以不進入治療區域為原則；機構可設置等候區供陪病者於等待期間休憩使用，惟等候區仍應符合社交距離及避免飲食等規定。

四、機構病人抗原快篩陽性者，應通報嚴重特殊傳染性肺炎，並進行核酸檢測。抗原快篩陽性病人可於原機構完成當次透析，但應符合分流分艙、固定團隊、固定透析機台及安排於人流較少角落區域等感控原則。倘透析院所囿於空間設備等條件無法提供服務時，應妥為安排轉診至應變醫院或地方政府衛生局指定之醫療院所進行核酸採檢及透析。

肆、因應機構內發生 COVID-19 確定病例管控措施

- 一、由於機構可能發生透析病人在接受照護後才被通報確診為 COVID-19 個案，或是被通報確診的工作人員於可傳染期有出勤等情形，當機構內發生 COVID-19 確定病例事件，密切接觸者匡列原則及應變處置建議，請參考「醫院因應院內發生 COVID-19 確定病例之應變處置建議」辦理。
- 二、考量血液透析屬必要且急迫性之醫療服務，倘機構之工作人員因密切接觸 COVID-19 確診病人而匡列為居家隔離對象，致機構人力短缺無法維持重要業務時，機構可依循「因應 COVID-19 疫情醫療照護工作人力短缺之應變處置建議」，於啟動人力備援計畫後人力仍然不足，且無法將病人轉介至其他機構時，可提前召回可能仍具傳播風險之醫療照護工作人員返回工作。
- 三、匡列為密切接觸者之門診透析病人，於居家隔離期間應持續接受血液透析照護，並依循「居家隔離、檢疫或自主健康管理者接受醫療照護時之感染管制措施」，是類無相關症狀病人於接受照護前，應接受 1 次抗原快篩。

設有血液透析室之醫療機構因應 COVID-19 整備現況查檢表

機構名稱：_____

稽查項目	查檢內容	完成整備情形		
		已 完 成	執 行 中	未 執 行
1.應訂有合適之隔離防護措施及動線規劃	依據疾病管制署公布之「設有血液透析室之醫療機構因應 COVID-19 感染管制措施指引」，內化明定工作人員於不同狀況應採用的個人防護裝備（PPE），人員清楚 PPE 使用時機與正確穿脫方式。			
	於機構出入口、掛號櫃檯、門診區與網頁等有明確公告、廣播或志工主動關懷等方式，提醒進入機構的人（如病人、訪客、工作人員、外包人員等）請佩戴口罩、落實手部衛生、呼吸道衛生及咳嗽禮節。			
	於機構出入口、掛號櫃檯、門診區有協助未佩戴口罩的就醫民眾與訪客佩戴口罩的機制。			
	於機構入口明顯處宣導(如：張貼海報)，提醒請有發燒、呼吸道症狀、味覺嗅覺喪失、不明腹瀉等 COVID-19 相關症狀及具 COVID-19 感染風險的病人主動告知工作人員。			
	在病人進入治療區域之前，有提示機構工作人員詢問旅遊史（如最近 14 日旅遊史）、職業別、接觸史及是否群聚之機制，並確實執行。			
	訂有發燒篩檢及不明原因發燒病人處理標準作業程序，病人就診動線規劃適當，且第一線工作人員均瞭解。有發燒、呼吸道症狀、味覺嗅覺喪失、不明腹瀉等症狀的病人，經醫師評估為疑似 COVID-19 或其他具群聚傳染性之疾病，應立即分流，採取必要的隔離措施。			
	於機構出入口、門診等區域設有及早發現發燒或呼吸道症狀之就醫民眾與訪客的機制，如紅外線體溫監測、發燒篩檢站、或請工作人員詢問病人是否有發燒或呼吸道症狀等方式。			
2.辦理因應	依據工作人員特性規劃辦理 COVID-19 教育訓練，視需			

稽查項目	查檢內容	完成整備情形		
		已 完 成	執 行 中	未 執 行
傳染病防治教育訓練	要將以下主題納入訓練課程： <ol style="list-style-type: none"> (1) COVID-19 感染症狀 (2) 手部衛生、呼吸道衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩之重要性 (3) 適當的個人防護裝備使用 (4) 病人分流程序（包含病人安置） (5) 工作人員的請假政策 (6) 工作人員自我監測發燒或呼吸道症狀（包含生病不上班） (7) 如何診斷與通報 			
	機構針對以下主題提供病人衛生教育： <ol style="list-style-type: none"> (1) COVID-19 簡介（例如：感染症狀、傳播方式） (2) 有症狀時通知醫療照護工作人員之重要性 (3) 適當防護措施（例如：手部衛生、咳嗽禮節、維持社交距離及佩戴口罩） (4) 機構保護病人的措施（例如：限制訪客、更換個人防護裝備） 			
3.傳染病監視通報機制	機構內醫療照護工作人員確實掌握嚴重特殊傳染性肺炎通報條件與通報方式。			
	有專人負責嚴重特殊傳染性肺炎通報衛生主管機關與相關聯繫事宜。			
4.病人安置	照護疑似或確診 COVID-19 病人時，依據分流分艙、分區照護、固定團隊、固定透析設備、固定空間之照護原則。			
	針對疑似或確診 COVID-19、有相關症狀或居家隔離/檢疫/或未具有自主健康管理期間呼吸道檢體 SARS-CoV-2 核酸檢驗陰性結果之自主健康管理病人，規劃於單獨的病室接受透析治療，或安排遠離主要動線的空曠或人流較少的角落區域，與其他病人保持至少 2 公尺距離。			

稽查項目	查檢內容	完成整備情形		
		已 完 成	執 行 中	未 執 行
5. 醫療照護 工作人員 健康監測 與管理	訂有非懲罰性、具彈性且符合公共衛生政策的請假政策，且工作人員都能知悉；例如：允許和鼓勵生病的工作人員休假或限制從事照護工作；尤其針對有發燒或出現呼吸道症狀或癥候的醫療照護工作人員須停止工作至退燒後至少 24 小時（指未使用如 acetaminophen 等退燒藥）。			
	應訂定機構內全體工作人員（含流動工作人員）健康監測計畫，並有異常追蹤處理機制。			
6. 手部衛生	於血液透析床、護理站、病床旁、入口及候診區附近，提供手部衛生用品（如：酒精性乾洗手液等），或提供醫療照護工作人員攜帶型酒精性乾洗手液。			
	訂有醫療照護工作人員手部衛生遵從性之稽核機制。			
7. 環境清潔 與消毒	訂有環境清潔消毒標準作業流程，包含血液透析床、血液透析設備、桌椅等共用設備之清潔流程。			
	環境清潔人員清楚 PPE 使用時機與正確穿脫方式，及消毒劑使用方式，並有稽核機制。			
8. 疫苗接種	訂有機構 COVID-19 疫苗接種計畫，並落實執行。 透析病人 COVID-19 接種率：_____ % 醫療照護工作人員 COVID-19 接種率：_____ %			
	針對未完成 COVID-19 疫苗接種者，應訂有相關健康監測與管理機制，以提升保護。			
9. 因應機構 內發生確 定病例之 應變處置	訂有機構內發生 COVID-19 確定病例之應變處置計畫，並辦理實地或桌上演練。			
	規劃具血液透析需求之疑似或確定 COVID-19 個案，集中照護或後送專責醫院之機制。			

稽查人員簽章：_____

稽查日期：_____年_____月_____日

伍、參考資料

1. CDC. Interim Additional Guidance for Infection Prevention and Control Recommendations for Patients with Suspected or Confirmed COVID-19 in Outpatient Hemodialysis Facilities. Available at: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/dialysis.html>.
2. CDC. Preparing Your Dialysis Facility for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Available at: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/hcp/fs-COVID19-Dialysis-Facility.pdf>.
3. NICE (National Institute for Health and Care Excellence). COVID-19 rapid guideline: dialysis service delivery. Available at: <https://slanh.net/wp-content/uploads/2020/03/covid19-rapid-guideline-dialysis-service-delivery-pdf-66141894031045-1.pdf>.
4. APIC. Guide to the Elimination of Infections in Hemodialysis, 2010. Available at: <https://apic.org/wp-content/uploads/2019/02/APIC-Hemodialysis.pdf>.
5. 衛生福利部疾病管制署：醫療機構因應 COVID-19 感染管制指引。取自：
https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/I92jtldmxZO_oofPzP9HQ。
6. 衛生福利部疾病管制署：COVID-19 基層診所感染管制措施指引。取自：
https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/I92jtldmxZO_oofPzP9HQ。
7. 衛生福利部疾病管制署：醫療機構血液透析感染管制措施指引。取自：
<https://wwwap.cdc.gov.tw/Uploads/380a8d23-d5e2-4bfb-8eb0-c826d1b1b7bc.pdf>。
8. 衛生福利部疾病管制署：居家隔離或檢疫者接受醫療照護時之感染管制措施。取自：
https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/I92jtldmxZO_oofPzP9HQ。

9. 台灣腎臟醫學會：透析醫療院所防護武漢肺炎 COVID-19 感染處置規範(第 9 版)。取自：

<https://tcdan.org.tw/upload/media/pic/20200216.pdf>。

三、111 年度會費繳交

111 年度會費於 111 年 1 月 1 日開始繳交，繳費資訊如下：

常年會費	
負責醫師	10000 元
非負責醫師	1000 元
醫院會友	1000 元

繳費方式	
郵政劃撥	戶名：台灣基層透析協會 帳號：5 0 2 6 5 6 1 4
銀行匯款或 ATM 轉帳	戶名：社團法人台灣基層透析協會 匯入行庫：合作金庫 台大分行 (銀行代碼：0 0 6，分行代碼：1 3 4 6) 帳號：1 3 4 6 - 7 1 7 - 0 3 3 5 9 8

98-04-43-04 郵政劃撥儲金存款單		◎寄款人請注意背面說明 ◎本收據由電腦印錄請勿填寫	
收款帳號 5 0 2 6 5 6 1 4	金額 (阿拉伯數字)	郵政劃撥儲金存款收據	
通訊欄 (限與本次存款有關事項) 匯款人： 院所： 電話： 地址：	收款戶名 台灣基層透析協會	收款帳號戶名	
	寄款人 <input type="checkbox"/> 他人存款 <input type="checkbox"/> 本戶存款	存款金額	
	姓名	電腦紀錄	
	地址與電話	主管：	
111 年度會費 <input type="checkbox"/> 1.院所負責醫師：壹萬元 <input type="checkbox"/> ①開立個人捐款收據 <input type="checkbox"/> ②開立診所會費收據 <input type="checkbox"/> 2.非負責醫師：壹仟元 (開立個人會費收據) <input type="checkbox"/> 3.醫院會友：壹仟元 (開立個人捐款收據)	經辦局收款章戳		
虛線內備供機器印錄用請勿填寫		經辦局收款章戳	

四、111 年度已繳納「院所負責醫師一萬元會費」名單

目前 111 年度累計 282 家院所已繳納一萬元會費，請尚未繳納會費之院所務必繳交！

基隆				
安基診所	泰安內科診所	元翔診所	佳基內科診所	
台北市				
安德聯合診所	洪永祥診所	景安診所	滙安診所	櫟安診所

怡仁診所	柏安診所	百齡診所	安禾聯合診所	宏林診所
元林診所	佑佳內科診所	元泰診所	萬澤內科診所	晟幸診所
文林診所	佳德內科診所	慶如診所	弘德診所	東成診所
和泰內科診所	杏心診所	康禾診所	華榮診所	怡德診所
祐腎內科診所	佳康內科診所			
新北市				
瑞和診所	仁川診所	仁滙診所	佳聖診所	安新診所
泓安內科診所	陳尚志診所	喜聖診所	康全診所	仁美診所
仁佳診所	恩康診所	富康診所	思源內科診所	佳腎內科診所
新庚診所	文鼎診所	泰山新庚診所	逸好診所	逸守診所
逸全診所	逸安診所	逸原診所	安庚內科診所	展源內科診所
宏明診所	匯康內科診所	明暘診所	輝德診所	佳永診所
德澤診所	東暉診所	漳怡內科診所	東辰診所	板杏內科診所
禾原內科診所	吉泓診所	幸安診所	安旭診所	承安聯合診所
杏軒診所	板橋仁安內科診所	集賢內科診所	集安診所	慧安診所
禾安診所	佳佑診所	佳愛診所	元福診所	新欣診所
國城診所	家祥診所	昕隆診所	仁暉診所	新莊新仁診所
江生診所	益康診所	晉康診所	戴良恭診所	世康診所
欣禾診所	祥佑診所	怡和診所		
桃園				
安禾診所	中慎診所	桃安診所	中庚診所	全安診所
桃德診所	宇康診所	元康診所	桃庚聯合診所	安庚內科診所
鑫庚內科診所	宏元診所	惠民診所	榮元診所	家誼診所
聖文診所	和暘診所	安慧診所	安馨大溪診所	杏福診所
新竹				
新竹安慎診所	竹東安慎診所	君和內科診所	成民內科診所	

苗栗				
宏福診所	長春診所			
台中				
長安診所	大業診所	蔡精龍診所	雅林診所	旭康診所
信安診所	大道診所	漢寧診所	榮平診所	興豐內科診所
傑安內科診所	佳弘診所	京冠診所	民安診所	榮耀診所
仁德診所	育恩診所	慶華診所	瑞東診所	仁謙診所
淨新診所	仁誠診所	高美內科診所	佳福診所	東豐診所
東福診所	合安診所	加安診所	佳仁內科診所	祐和診所
安新診所	宜家診所	佳楊診所	佑全診所	中清診所
彰化				
健新內科診所	里仁診所	建霖內科診所	合濟診所	惠聖診所
旭安診所	員美診所	佳安內科診所	安馨彰美內科診所	佳文內科診所
雲林				
大安診所	惠腎診所	崙安診所	宏德診所	螺安診所
安佳診所	腎安診所			
嘉義				
慈安診所	宏醫診所	安馨民雄診所	康明診所	安馨嘉義內科診所
家馨診所	正安診所			
南投				
草屯陳診所	農安診所	金生診所	安馨竹山內科診所	益民診所
台南				
仁得內科診所	林建任內科診所	欣姿診所	文賢內科診所	懷仁內科診所
康福內科診所	以琳內科診所	陳相國聯合診所	沅林內科診所	迦南內科診所
昕安內科診所	光明內科診所	公園內科診所	十全診所	榮銘內科診所
顏大翔內科診所	銓莘診所	陳冠文內科診所	弘典內科診所	佑馨診所

立福內科診所	奇安內科診所	華康內科診所	謝智超達恩診所	杏福內科診所
佳新診所	杏和診所	蘇炳文內科診所	泰祐診所	佳宜內科診所
尚禾內科診所	佳宏診所			
高雄				
宗禾診所	偉仁健康診所	五福診所	鴻源診所	裕生診所
東陽診所	優彼高榮育仁診所	蔣榮福診所	鴻仁健康診所	岡山內科診所
長清診所	安泰診所	明港診所	聖安診所	興義診所
好生診所	路竹內科診所	仁康診所	吳三江內科診所	高健診所
新鴻遠診所	幸安診所	揚銘診所	佑鎮診所	佑強診所
愛欣診所	佳澤診所	茂田診所	安可診所	為好診所
湖康診所	安馨楠梓內科診所	田源診所	壬禾診所	尚清診所
高美診所	佳明診所	芳民診所	佳生診所	佳醫診所
佳恩內科診所				
屏東				
大武診所	宇安診所	德樹診所	立安診所	沐民診所
人晟診所	瑞基診所	德家內科診所	仁佑診所	東和內科診所
佳屏診所	德埔診所			
宜蘭				
傳康診所	陳文貴診所	吳得中診所	得安診所	青田診所
花蓮				
維德診所	懷德診所	劉明謙診所	美崙聯安診所	嘉恩診所
台東				
東興內科診所	陳明正內科診所			
澎湖				
惠安診所				